

KOLONOSKOPIA – badanie jelita grubego od wewnątrz. Wykonywane jest za pomocą giętkiego aparatu z umieszczoną w jego końcówce małą kamerą. W odróżnieniu od badania radiologicznego (prześwietlenie) pozwala nie tylko na bardzo dokładne obejrzenie wnętrza jelita, ale także na pobranie wycinków lub usunięcie niektórych zmian chorobowych (polipów, zmian naczyniowych).

Badanie trwa ok 20 minut. Często w trakcie badania pacjent odczuwa ból brzucha opisywany jako „rozpychanie” bądź „klucie”, choć zwykle nie jest on bardzo silny ani długotrwały. Pobieranie wycinków bądź usuwanie zmian nie jest w ogóle odczuwane przez pacjenta. Najczęściej ból odczuwają kobiety szczupłe, drobnej budowy ciała, po przebytych infekcjach dróg rodnych oraz osoby, które przechodziły zabiegi operacyjne na jamie brzusznej – u tych pacjentów badanie jest najlepiej wykonać w znieczuleniu dożylnym.

Ryzyko wystąpienia powikłań jest małe – ocenia się na ok. 0,7 promila (jedno badanie na ok.1500 badań).Najczęstsze powikłania to krwawienia (np. po usunięciu polipa) i przebicie jelita. Wystąpienie powikłania wymaga na ogół leczenia operacyjnego. Z uwagi na możliwość wystąpienia powikłań **KONIECZNYM !!!** warunkiem wykonania badania jest posiadanie przez pacjenta pisemnego skierowania.

Przygotowanie do badania

W ciągu tygodnia poprzedzającego badanie należy stosować dietę lekkostrawną, gotowaną; unikać spożywania pieczywa gruboziarnistego, pieczywa ciemnego, potraw wzdymających (np. fasolka szparagowa, brukselka, kalafior), unikać surowych owoców i warzyw, zwłaszcza tych które zawierają drobne pestki (winogrono, porzeczki, kiwi, truskawki, maliny), unikać potraw, które zawierają mak, siemię lniane, pestki słonecznika, nie spożywać kaszy, ryżu. Należy unikać buraków, szpinaku, gdyż zmieniają zabarwienie treści jelitowej. Również na tydzień przed badaniem należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.

W dniu poprzedzającym badanie należy spożywać wyłącznie posiłek płynny do godz.14.00.W godzinach 15.00-23.00 rozpoczyna się przyjmowanie preparatu FORTTRANS wg ulotki dołączonej do opakowania leku (4 saszetki rozpuścić w 4 litrach wody). Preparat ma nieprzyjemny smak, ale jest bardzo skuteczny. Smak Fortransu można poprawić, dodając sok z cytryny bez pestek i schładzając sporządzony roztwór w lodówce. W trakcie przyjmowania preparatu można pić wodę przegotowaną lub wodę mineralną niegazowaną. Receptę na Fortrans powinien wypisać lekarz kierujący na badanie.

Pacjent na badanie zgłasza się na czczo!!!

UWAGA!!!

**Na 7 dni przed badaniem prosimy o potwierdzenie obecności
pod nr tel.22 579 52 83**